


## COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO TUBERCULOSIS SENSIBLE, TUBERCULOSIS FARMACORESISTENTE Y LEPROA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, ACUMULADO A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 1- 30, 2016.

### HALLAZGOS DEL COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE TUBERCULOSIS

Según datos del sistema de vigilancia en salud pública para el evento Tuberculosis que registraron residencia en el Distrito de Cartagena con corte de semana epidemiológica 1- 30 del 2016, el número de casos notificados es de **158 casos**, evidenciándose un aumento en la notificación a semana epidemiológica 1 y 28. Con respecto al año anterior el número de casos reportados en este mismo periodo fue de **154 casos**. Dentro del grupo de eventos de interés en salud pública a vigilar también forman parte la tuberculosis farmacoresistentes a la fecha NO hay casos notificados a Sivigila.

**Grafico 1: COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LA TUBERCULOSIS, A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 1- 30 CARTAGENA, 2016**




Fuente: Sivigila 2016

Según el comportamiento de la variable genero el 62,0 %(n=98) de los casos son de género masculino frente a un 37,9% (n=60) de género femenino, predominando la aparición de la enfermedad en el género masculino. Con el propósito de medir la efectividad de las acciones de detección, control y vigilancia de la enfermedad y dando respuesta al indicador tasa de incidencia de tuberculosis por sexo se evidencia a semana epidemiológica 30 del 2016 una tasa


de incidencia de 16,93 casos por 100.000 habitantes en hombres y 10,31 por 100.000 habitantes en mujeres. Con relación al indicador porcentaje de casos de acuerdo al tipo de tuberculosis el 85,4% (n=135) son casos reportados por tipo de tuberculosis pulmonar, mientras que el 14,5 % (n=23) se reportan por tipo de tuberculosis extrapulmonar Manteniéndose así un aumento en el reporte para el evento por el tipo de tuberculosis pulmonar. Ver grafica 2

**Grafico 2: COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO, SEGÚN TIPO DE TUBERCULOSIS A SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1- 30, CARTAGENA 2016.**



Fuente: Sivigila 2016


**Grafico 3: COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLÓGICO DE TUBERCULOSIS, SEGÚN LOCALIZACION EXTRAPULMONAR SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1-30, CARTAGENA 2016**



Fuente: Sivigila 2016

Con relación al indicador porcentaje de tuberculosis, según clasificación de ingreso De los 158 casos notificados a semana epidemiológica 30 del 2016 el 86,7 %(n=137) de los casos de tuberculosis todas las formas confirmados corresponden a casos nuevos, el 13,29%(n=21) restantes son casos previamente tratados. Los pacientes previamente tratados son pacientes con recaída, fracaso o pacientes con tratamiento después de pérdida al seguimiento. Ver grafica 4. A semana epidemiológica 30 del 2016 la incidencia de tuberculosis general fue de 13,51 casos nuevos de tuberculosis todas las formas por cada 100.000 habitantes. Con el objetivo de ayudar a determinar la realización de las actividades de vigilancia y control de tuberculosis y perfil de resistencia, se halla el indicador porcentaje de casos por condición de ingreso al programa a los que se les realizo cultivo, el resultado para este indicador fue que solo al 5,0% (1 caso) de los casos previamente tratados de tuberculosis se le realizo cultivo.


**Grafico 4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CLASIFICACION DE INGRESO DE TUBERCULOSIS, A SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1-30, CARTAGENA 2016**



Fuente: Sivigila 2016

Teniendo en cuenta la notificación del evento Tuberculosis, se tiene hasta semana epidemiológica 30 del 2016 un total de 158 casos notificados, los grupos de edad más afectados fueron de 30 -34 años con 22 casos Y 50-54 con 20 casos. Ver gráfica 5.

**Grafico 5. COMPORTAMIENTO DE TUBERCULOSIS SEGÚN GRUPO DE EDAD A SEMANA EPIDEMIOLOGICA 1- 30, CARTAGENA 2016.**



Fuente: Sivigila 2016


La tuberculosis y la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH se encuentran epidemiológicamente asociados en cuanto a pronóstico de riesgo, sea para desarrollar TB en un paciente VIH positivo primario o como indicador pronóstico de la infección por VIH. La asociación de Tuberculosis y VIH potencian sus morbilidades. Del total de los casos con tuberculosis (n=158) Se encontraron 26 casos positivos para asociación TB-VIH/SIDA, lo que da como resultado a semana epidemiológica 30 del 2016 una **Tasa de coinfección** TB/VIH de 2,56 casos por cada 100.000 habitantes. Es muy importante realizar evaluaciones de la calidad de los registros de los pacientes para evitar subregistros.

Para el indicador porcentaje de coinfección TB/VIH-SIDA según requerimiento de la OMS los resultados del análisis de la información a semana epidemiológica 1- 30 del 2016 fueron:

- El 16,40 % de los casos de tuberculosis todas las formas confirmados corresponden a casos de coinfección TB /VIH.

- El 15,55 % de los casos de tuberculosis pulmonar confirmados corresponden a casos de coinfección TB/VIH
- El 21,7% de los casos de tuberculosis extrapulmonar confirmados corresponden a casos de coinfección TB/VIH.


**Grafico 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN COINFECCIÓN TB/VIH SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1- 30, CARTAGENA 2016.**



Fuente: SIVIGILA 2016

Con relacion al el comportamiento geografico para el evento tuberculosis según localidad el 30,37% (n=48) de los casos se presentaron en la localidad 01 Historica y del Caribe, el 44,30% (n=70) en la localidad 02 de la Virgen y Turistica y el 24,0% (n= 38) en la localidad industrial y de la Bahia, sin datos 2 casos correspondiente al 1,26% .Ver gráfico 7.

**Grafico 7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN LOCALIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 1-30, 2016.**



Fuente: Sivigila 2016

Con el fin de determinar el porcentaje del total de casos confirmados de tuberculosis que falleció se revisa el número de casos de tuberculosis que presentaron condición final muerte con corte a semana epidemiológica 30 se notificaron al sivigila 12 casos de tuberculosis con condición final muerte, en el programa de tuberculosis del distrito de Cartagena se han registrado durante el mismo periodo 17 fallecidos; teniendo en cuenta lo anterior tenemos una tasa de mortalidad de 1.18 por 100,000 habitantes en el distrito de Cartagena.

### HALLAZGOS DEL COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DE LEPROSIS

Dentro del grupo de eventos de interés en salud pública a vigilar forman parte el evento lepra se han notificado a semana epidemiológica 1-30 en el distrito de Cartagena 5 casos. Ver tabla 1 y 2.

**Tabla 1. Comportamiento epidemiológico de lepra según condición de ingreso, clasificación clínica y bacteriológica semana epidemiológica 1- 30 del año 2016.**

Semana Epidemiológica	Clasificación Clínica/Bacteriológica de LEPROSIS	Condición de ingreso
1	Paucibacilar/multibacilar	Nuevo
6	multibacilar/multibacilar	Reingreso abandono recuperado
17	multibacilar/multibacilar	Nuevo
21	multibacilar/multibacilar	Recidiva
23	multibacilar/multibacilar	Nuevo

**TABLA 2. COMPORTAMIENTO DEMOGRAFICO Y SOCIAL DE LOS CASOS DE LEPRO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA A SEMANA 30 DEL AÑO 2016**

VARIABLE	CATEGORIA	CASOS	%
<b>tipo de régimen</b>	contributivo	3	60,0
	subsidiado	2	40,0
<b>Grupo de edad</b>	menores de un año	0	-
	1 a 4 años	0	-
	5 a 9 años	0	-
	10 a 14 años	0	-
	15 a 19 años	0	-
	20 a 24 años	0	-
	25 a 29 años	2	40,0
	30 a 34 años	0	-
	35 a 39 años	1	20,0
	40 a 44 años	0	-
	45 a 49 años	0	-
	50 a 54 años	0	-
	55 a 59 años	2	40,0
	60 a 64 años	0	-
	65 y más años	0	-
	<b>Localidad</b>	1 Histórica	3
2 la virgen		0	-
3 industrial		2	40,0
<b>SEXO</b>	Femenino	4	80
	Masculino	1	20

Elaboro: TULIA DEL C.CASTILLA DEJANON  
Referente TUBERCULOSIS-VIH/SIDA  
P.U Vigilancia en Salud Pública - DADIS